

	SOLÜSYONLAR VE MULTİDOZ İLAÇLAR KULLANIM SÜRELERİ	DökümanNo	ECZ.LS.12
		Yayın Tarihi	01.09.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Satınalma ve Depo Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

İlaç/Solüsyon Adı	Kullanım Süresi	Kullanılan Etiket
Alkol, Aseton, Eter	Orijinal kabında son kullanma tarihine kadar, başka kaba aktarıldığında 1 hafta süresince kullanılır.	Solüsyon Etiket
Betadin,Biokadin ve Povidon Iyot	Orijinal kabında son kullanma tarihine kadar, Açıldığında veya başka kaba aktarıldığında 1 hafta süresince kullanılır.	
Formol	Son kullanma tarihine kadar kullanılır.	
Temizlik Kimyasalları	Kullanım kılavuzundaki süreler geçerlidir.	
Sıvı Sabunlar	7 gün	
Ara Öğün	Kata çıktıktan sonra 24 saat içinde tüketilmeli	Gıda Maddeleri Etiket
Ensure, Glucerna.. vb	24 saat sonra değiştirilmelidir.	
Mama torbaları/setleri	24 saat sonra değiştirilmelidir	
Serum Setleri Kateterler	72 saatte bir değişir. Ancak kan ve kan ürünleri veya lipid emülsiyonlar uygulanmış ise bu süre 24 saattir.	Serum Seti/Nemlendirici Etiket
Gavaj enjektörü	Kirlendikçe değiştirilir	
Nemlendiriciler	48 saat süresince kullanılır	
Oksijen Manometreleri	48 saat süresince kullanılır.	Malzeme Takip Etiket
İnfüzyon olarak verilen ilaçlar	İnsülin içerikli olanlar 4 saatte bir değiştirilir. Diğerleri 24 saatte bir değişir. Bazı özel ilaçlar, prospectus bilgisine göre değiştirilir. (örn.Nipruss)	Parenteral Karışım Etiket
Majistral İlaçlar	Eczacı tarafından belirlenen süre içinde kullanılır.	Majistral İlaç Etiket
Distile su	Açıldıktan sonra 24 saat süresince kullanılır	İlaç Saklama Etiket
Flakonlar	Stabil kalıyorsa açıldıktan sonra en fazla 24 saat uygun sıcaklıkta aseptik şartlarda saklanmışsa kullanılır.	
Göz ve Kulak Damlaları	Açıldıktan sonra 7 gün içerisinde kullanılır.	
İnsülin	Açıldıktan sonra 21 gün uygun sıcaklıkta aseptik şartlarda saklanmışsa kullanılır.	
Pomadlar	Açıldıktan sonra 7 gün içinde kullanılır.	
Şuruplar	Açıldıktan sonra 7 gün içerisinde kullanılır.	
Vazelin	Orijinal kabında son kullanma tarihine kadar, açıldıktan sonra her hasta için özel olarak hazırlanır 24 saat süresince oda sıcaklığında saklanır	