

	CİLT ANTİSEPSİSİ TALİMATI	Döküman No	ENF.TL.05
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	01
		Rev. Tarihi	29.12.2015
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1. AMAÇ

Hastane enfeksiyonlarını önlemek amacıyla cilt antisepsisi konusunda yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Tüm birimleri, doktor, hemşire ve laborantları kapsar.

3.TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur.

4.UYGULAMA

4.1. Cilt Hazırlığı İçin Uygun Antiseptikler

4.1.1. Cilt antisepsisi alkol (% 70), İyodofor (povidon iyot), oktenisept kullanılmalıdır.

4.1.2. Alkol, çabuk etkili, fakat kalıcı etkinliği azdır. Özellikle santral kateterler için cilt hazırlanmasında tek başına kullanılmamalıdır

4.1.3. İyodoforlar, cilt ve mukozalar için oldukça elverişli antiseptiklerdir. Kalıcı etkileri sınırlı ve kısa süreli antiseptik bileşikler olup, tahriş edici değillerdir.

4.1.4. Klorheksidin, kalıcı etki göstermesi nedeniyle antibakteriyel etkinin uzun süre devam etmesi gereken durumlarda tercih edilmelidir. Alkoldeki çözeltisi tercih edilmelidir.

4.2 Damar İçi Kateter ve Diğer İşlemler İçin Cildin Hazırlanması

4.2.1. Eller, " **El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatına**" uygun yıkanmalı ve eldiven giyilmelidir.

4.2.2. Uygulama bölgesi alkol 1 dk, iyodofor preparatları kullanılıyorsa birkaç kez farklı gazlı bez kullanılarak merkezden çevreye doğru yeniden merkeze dönmeden en az 2 dk süre ile silinmelidir.

4.2.3. Silinen alan tekrar palpe edilmemelidir.

4.3. İnzisyon Yerinin Hazırlanması

4.3.1. Kıl temizliği gerekiyorsa elektrikli traş makineleri ile ameliyattan hemen önce yapılmalıdır.

4.3.3. İnzisyon bölgesi, olası kesi ve dren yerlerini de kapsayacak biçimde, merkezden periferine doğru dairesel dönme hareketleriyle en az 4 kez gaz bez değiştirilerek ve en az 1 dakika (iyodofor için 2 dakika) süreyle antiseptikle silinerek kuruması beklenmelidir.

5.İLGİLİ DOKUMAN

İlgili dokuman yoktur.