



## KISITLI ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI

Dokuman No	ENF.TL.20
Yayın Tarihi	29.05.2014
Rev.No	00
Rev.Tarihi	
Sayfa No	2/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

### 1.AMAÇ

Antibiyoterapinin doğru şekilde uygulanmasının sağlanması.

### 2. KAPSAM

Hekimler.

### 3.TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur

### 4. UYGULAMA:

4.1. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de antibiyotiklere direnç giderek artmaktadır.

Bu durum hem hasta sağlığı açısından ciddi problemler oluşturmakta hem de önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerde hastane enfeksiyonlarını en az düzeye indirmeye yönelik çalışmalar devam ederken, yaşanan en önemli problem geniş spektrumlu antibiyotiklerin kontrolsüz bir şekilde yaygın olarak kullanılmasıdır.

Sonuçta ortaya çıkan direnç problemi hastalarımızı güç durumda bırakmaktadır.

Bu nedenle EKK tarafından hastanemizde bazı antibiyotiklerin kısıtlı kullanılması kararlaştırılmıştır.

Kısıtlanması gereken antibiyotikler aşağıda belirtilmiştir.

#### 4.1.1. Antipseudomonal Sefalosporinler

- Seftazidim (Seftaz, Fortum vs.)
- Sefepim (Maksipime)

#### 4.1.2. Karbapenemler

- İmipenem (Tienam)
- Meropenem (Meronem)

#### 4.1.3. Parantral Kinolonlar

- Siprofloksasin (Cipro, Ciprosin)
- Ofloksasin (Tarivid, Girasid vs.)
- Levofloksasin (Tavanic)
- Moksifloksasin (Avelox)

(Oral olanlar kısıtlama dışındadır.)

#### 4.1.4. Glikopeptitler

- Vankomisin (Vankomisin, Vancomycin-DBL vs.)
- Teikoplanin (Targosid)

#### 4.1.5. Oksazolidinonlar

## KISITLI ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI

Dokuman No	ENF.TL.20
Yayın Tarihi	29.05.2014
Rev.No	00
Rev.Tarihi	
Sayfa No	2/2

- Linezolid ( Zyvoxid)

**4.2.**Yukarıda belirtilen antibiyotiklerin kullanılması için endikasyon saptandığında Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) ile konsültasyon yapılır ve bu karar birlikte alınır. EHU doğrudan veya EKK hemşiresi aracılığı ile her zaman ulaşılabilir.

**4.3.**Yukarıda belirtilen antibiyotikler (kısıtlama programında olan antibiyotikler) gece order edildiğinde eczacı/eczane teknisyeni tarafından EHU na telefonla bilgi verilip, ilk dozu verilir. Devamı için EHU ndan mutlaka konsültasyon istenir. Gündüz order edilen antiibiyotikler eczacı/eczane teknisyeni tarafından EHU'na telefonla bilgi verilip, EHU konsültasyona gelene kadar ilk dozu verilir, devamı için EHU'nın kararı beklenir.

### **5.İLGİLİ DOKUMANLAR**

İlgili dokuman yoktur.