



ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ KISITLI ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI

Dokuman No	ENF.TL.24
Yayın Tarihi	13.10.2014
Rev.No	00
Rev.Tarihi	
Sayfa No	2/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Artan antibiyotik direncinin azaltılması, yanlış kullanıma bağlı yan etkilerin ve ekonomik kayıpların azalması için antibiyoterapinin doğru şekilde uygulanmasının sağlanması.

2. KAPSAM

Hekimler

3.TANIMLAR

Özel bir tanımı yoktur.

4.UYGULAMA

4.1.Kısıtlanması gereken antibiyotikler aşağıda belirtilmiştir.

4.1.1. Sefalosporinler

- Seftriakson (Novasef, Rosefin vb.)
- Seftazidim (Seftaz, Fortum vb.)
- Sefepim (Maksipim)

4.1.2. Karbapenemler

- İmipenem (Tienam)
- Meropenem (Meronem)
- Ertapenem (İnvanz)

4.1.3. Parantral Kinolonlar

- Siprofloksasin (Cipro, Ciproksin)
 - Ofloksasin (Tarivid, Girasid vb.)
 - Levofloksasin (Tavanic)
 - Moksifloksasin (Avelox)
- (Oral olanlar kısıtlama dışındadır)

4.1.4. Glikopeptitler

- Vankomisin (Vankomisin, Edisin)
- Teikoplanin (Targosid)

4.1.5. Oksazolidinon

- Linezolid (Zyvoxid)

4.1.6. Makrolidler

- Klaritromisin (Parantral)

4.1.7. Antifungal Antibiyotikler

- Amfoterisin B (Klasik)
- Flukonazol Parenteral (Triflukan, Lumen)
- Kaspofungin (Cancidas)
- Lipid Kompleks Amfoterisin B
- Lipozomal Amfotrisin B (Fungizone, Ambisome)
- Varicanazole (V Fend)
- Anidulafungin (Eraxis)

4.2. Yukarıda belirtilen antibiyotiklerin kullanılması için endikasyon saptandığında Konsültan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) ile konsültasyon yapılır ve bu karar birlikte alınır. EHU doğrudan veya EKH aracılığı ile her zaman ulaşılabilir.

4.3. Yukarıda belirtilen antibiyotikler (kısıtlama programında olan antibiyotikler) için EHU'dan konsültasyon istenir.

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR