

Delici-Kesici Alet Yaralanmalarında Yapılması Gerekenler



- Yaralı bölgeyi su ve sabun ile yıkayınız
- Cilt antiseptiği (%70 alkol, %10 povidon iyot) ile siliniz.
- Yaralı bölgeyi sıkmayın ve kanatmaya çalışmayın.
- İnceleme, takip ve tedavi için mesai saatleri içinde Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesine başvurun.



Cemal Sair Sok.No.2 Mecidiyeköy

ŞİŞLİ

İSTANBUL

TÜRKİYE

cevre@cevrehastanesi.com.tr

0212 444 25 93 ALO CEVRE



Delici-kesici alet
yaralanmalarından korunma
önlemleri bilgilendirme broşürü
(sağlık çalışanları için)



Kesici -Delici Alet Yaralanmasından Korunma Konusunda Bilgilendirme Broşürü (Sağlık Çalışanları İçin)

Kesici -Delici Alet Yaralanması Nedir?

Kan vb. vücut materyali ile kontamine olmuş kesici-delici her türlü materyal ile derin perkütan yaralanmadır.

Kesici -Delici Alet Yaralanması İle Bulaşma Riski Yüksek Enfeksiyon Hastalıkları Hangileridir?


Kesici delici alet yaralanmalarında en kolay bulaşabilen enfeksiyon B hepatitidir. Hepatit B, Hepatit C ve HIV pozitif hastaların kan veya vücut materyelleri ile kontamine olmuş kesicidelici alet yaralanmalarında bu enfeksiyonların bulaşma riski (yüzdesi) ve belirtilerin ortaya çıkması için gereken süreler (kuluçka süresi) sırasıyla aşağıdaki gibidir.

HBV:%30; Kuluçka Süresi:50 -180 gün

HCV:%3; Kuluçka Süresi: 30 -150 gün

HIV:%0.3; Kuluçka Süresi:30 -90 gün

İÜ. CTF. 2007-2009 Kesici-Delici Alet Yaralanması Grafiği



Kesici -Delici Alet Yaralanmaları En Fazla Hangi Durumlarda Gelişir?

İğne ucunun kapağını kapatmaya çalışırken



Ameliyat esnasında

Hastaya yapılan her türlü invaziv girişim sırasında



Hastaya yapılacak parenteral tedavinin hazırlanması yada uygulanması aşamasında

Tıbbi atıkların toplanması taşınması esnasında



Kesici -Delici Yaralanmadan Korunma

Kan ve her türlü vücut sıvısı ile temasta eldiven kullanınız. Eldiveni çıkardıktan sonra ellerinizi mutlaka su ve sabun ile yıkayınız.

İğne uçlarını kullandıktan sonra kapaklarını kapatılıp sarı tıbbi atık kovalarına atınız

İğne ucu, bistüri, lam, lamel, kırılmış ampul, vb. kesici-delici atıkları sarı tıbbi atık kovası içine atınız. Tıbbi atıkların güvenli ve doğru bir şekilde kaynağında ayrılmasını, toplanmasını ve geçici atık deposuna taşınmasını sağlayınız.

Yaralanma sonrasında bağışıklanma, takip ve tedavi için acilen; mesai saati içinde Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesine; mesai saati dışında Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'na başvurun.



Hasta ile temas öncesinde ve sonrasında mutlaka el hijyeni sağlayınız