

SIVI VOLÜM EKSİKLİĞİ RİSKİ-HASTA BAKIM PLANI

Dokuman No: KLN.PL.43

Yayın Tarihi: 01.08.2016

Rev.No:00

Rev.Tarihi:

Sayfa No:1/1

Hastanın Adı Soyadı		Hemşirelik Tanısı		SIVI VOLÜM EKSİKLİĞİ RİSKİ			
Doğum Tarihi		Tanım		Oral sıvı alma yasağı olmayan bireyde intrasellüler, interstisyel ya da vasküler dehidratasyon olması ya da olma riski taşıması.			
Tanı							
Neden	Tanı Ölçütleri	Amaç	Girişimler	Tarih: Saat: Değerlendirme	Tarih: Saat: Değerlendirme	Tarih: Saat: Değerlendirme	Tarih: Saat: Değerlendirme
☐ Kontrolsüz DM ☐ Diebetus İnsiputus ☐ Hipertermi ☐ Enfeksiyonlar ☐ Aşırı miktarda drenaj ☐ Kusma ☐ Diyare ☐ Postoperatif kayıplar ☐ Aşırı diüretik ve laksatif kullanımı	☐ Oral olarak yetersiz sıvı alımı ☐ Aldığı-çıkardığı dengesizliği ☐ Kilo kaybı ☐ Deride kuruma pullanma ☐ İdrar miktarında azalma ya da aşırı artma ☐ Susuzluk hissi	☐ Sıvı volüm eksikliğinin giderilmesi ☐ Sıvı volüm eksikliği komplikasyonlarının önlenmesi	1.Hastanın günlük alması gereken sıvı miktarı hesaplanır ve eksik olan sıvıyı alması sağlanır.	☐ Sorun giderildi.	☐ Sorun giderildi.	☐ Sorun giderildi.	☐ Sorun giderildi.
			2. Hasta yeterli miktarda su ve diğer sıvıları alması için desteklenir.	☐ Sorun kısmen giderildi.	☐ Sorun kısmen giderildi.	☐ Sorun kısmen giderildi.	☐ Sorun kısmen giderildi.
			3. AÇT takibi yapılır.	☐ Sorun giderilemedi.	☐ Sorun giderilemedi.	☐ Sorun giderilemedi.	☐ Sorun giderilemedi.
			4. Günlük kilo takibi yapılır.	Not:	Not:	Not:	Not:
			5. Serum elektrolitleri, BUN, idrar ve serum osmolaritesi düzeyleri izlenir.				
			6. Kahve, çay ve greyfurt suyunun diüretik etkiye sahip olduğu ve sıvı kaybını arttırabileceği konusunda bilgi verilir.				
			7. Kusma, diyare, ateş ve drenajla ilgili ek sıvı kayıpları dikkate alınır.				
			8. Yara drenajı varsa drenajın miktarı ve tipi kayıt edilir. Sıvı kaybını azaltmak için yara kapalı tutulur.				
			9. Hasta GİS kanama ve hipovolemi belirti ve bulguları açısından takip edilir.	Hemşire/ İmza	Hemşire/ İmza	Hemşire/ İmza	Hemşire/ İmza
			10. Düzenli olarak CVP takibi yapılır.				
			11. Dr istemine göre kan ve kan ürünleri ya da elektrolitli sıvılar takılır.				