



FUE YÖNTEMİYLE SAÇ NAKLI (Almanca) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Dokuman No:	SAÇ.RB.01-03
Yayın Tarihi:	16.01.2010
Rev.No:	01
Rev.Tarihi:	25.03.2015
Sayfa No:	1/1

INFORMATIONEN UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR HAARTRANSPLANTATION MIT DER FUE- METHODE

Der Unterschied zwischen FUE- and FUT- Technik ist die Technik mit der das Haar aus dem Bereich entnommen wird. Als Ergebnis ist das Resultat beider Techniken gleich

Während der Erholungsphase nach der Operation sollte Folgendes beachtet werden.

- Wundheilung liegt zwischen 4-10 Tagen.
- Stimschwellungen können zwischen dem 3.- 5. Tag entstehen.
- Das Taubheitsgefühl im Bereich von dem das haar entnommen wurde (spender) kann ab 3 Wochen bis zu mehreren Monaten dauern.
- Während des gesamten Zeitraums des Haarwachstums (14 und 22 Wochen), kann es zu Akne auf der Haut kommen.
- Ihr Haar während des gesamten Zeitraums (14 und 22 Wochen), kann es zu Akne auf der Haut.
- Nach der Operation kann ein " Schock-Haarausfall- Syndrom" auftreten, so dass im und um den Bereich, an dem die Haartransplantation stattgefunden hat Haarausfall entstehen kann. Dieses Haar wird nach einer gewissen Zeit zu hundert Prozent (100 %) wieder wachsen. Das Syndrom tritt in der Regel bei 5% der männlichen Patienten und 50% der Frauen auf.
- Das vollständige Haarwachstum kann 8 bis 12 Monate dauern. Eine objektive Bewertung der Operationsergebnisse ist vor dieser Zeit nicht möglich.
- Vorübergehende/bleibende Hautveränderungen können verursacht werden wegen Durchblutungsstörung im Bereich, wo Haartransplantation ist geführt.
- Medizinische Ergänzung und/oder chirurgische Behandlung kann benötigt werden, wenn es nach dem Pflanzen erforderlich ist.

Haarausfall ist ein kontinuierlicher lebenslanger Prozess. Daher wird empfohlen, unmittelbar nach der Operation finasterid (Proscar, Propecia), Minoxidil (Regaine manner) zu benutzen die Anwendung zu unterstützen und zu Haarausfall zu verhindern. Alternativ können Sie auch den laser-Kamm benutzen.

Sollte Haarausfall anhalten oder sollten sie intensivere Haare wünschen (besonders bei Frauen), kann eine Intensivierungsoperation benötigt werden.

Die Haarintensität im Bereich von der Spitze des Kopfes bis zum Bereich der Haartransplantation wird immer durch eine zweite Operation unterstützt. Dieser Bereich ist niemals mit einer Operation intensiv genug.

Die haare die nach der 2. und 3. Operation transplantiert werden können vor allem an der Kopfspitze relativ spät wachsen.

Das vor der Operation vordefinierte Transplantat kann um etwa $\pm 10\%$ schwanken. Dieser Unterschied wird nicht in die Kosten übertragen.

Unsere Institutionen, ist für Haartransplantationen die zuvor an anderen Kliniken durchgeführt wurden nicht verantwortlich.

Bitte hinterlassen sie und Ihre Telefonnummer über die wir Sie eine Woche später und für die postoperative Kontrolldauer erreichen können.

Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und ich akzeptiere alle Punkte.

Datum:...../...../..... Stunde:.....

WENN BEWUSTSEIN DER PATIENT GERECHT IST;	WENN BEWUSTSEIN DER PATIENT NICHT GERECHT IST UND HAT EINEN GESETZLICHEN VERTRETER MIT;
Patient Name und Nachname :..... Adresse :..... Telefon Nummer :..... Unterschrift:	Gesetzliche Vertreter Name und Nachname:..... Adresi :..... Telefon Numarası :..... Unterschrift:
Doktor Name und Nachname: Unterschrift:	Doktor Name und Nachname: Unterschrift:
Zeuge **: Name und Nachname: Unterschrift:	Zeuge **: Name und Nachname: Unterschrift: