

	<b>ETİKETLEME TALİMATI</b>	Döküman No	STK.TL.01
		Yayın Tarihi	01.12.2009
		Rev. No	01
		Rev. Tarihi	04.06.2014
		Sayfa No	2/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Başhemşire	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

### 1. AMAÇ

Çevre Hastanesi servisleri ve polikliniklerinde kullanılacak etiketleri standardize etmek ve açıldıktan sonra tekrar kullanılacak ilaç, malzeme ve solüsyonların doğru, güvenilir şekilde kullanımlarını ve kullanım sürelerine göre talep miktarını belirleyebilmek ve kontrol edilebilmelerini sağlamaktır.

### 2. KAPSAM

Hastane içerisinde kullanılan etiket çeşitlerini ve ilaç/solüsyonların kullanım sürelerini, Tüm sağlık çalışanları, enfeksiyon kontrol komitesi üyelerini kapsar.

### 3. TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur.

### 4. UYGULAMA

#### 4.1. KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER

Baskı etiketler

4.2. Steril olmayan alanlarda kullanılan ilaç ve solüsyonların etiketlemeleri tabloda belirtildiği gibi basılı olan etiketler üzerine silinmeyecek ve okunabilir şekilde yazılır.

4.3. Steril olarak çalışılan bölümlerde gerektiği durumlarda ( doğumhane, radyoloji, ameliyathane) enjektöre çekilen ilaç içeriği enjektör üzerine asetatlı kalemle yazılır. Yazılacak olan bilgilerde hastanın adı, ilacın adı, dozu, hazırlayan kişinin adı, tarih ve saat belirtilir. Durum stabil olduğunda etiket düzenlenir.

4.4 Hastanemizde kullanılan tehlikeli maddeler (solüsyonlar) **Tehlikeli Madde Envanter Listesinde** belirtilmiştir.

### 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SA.LS.02 Tehlikeli Madde Envanter Listesi

İlaç/Solüsyon Adı	Kullanım Süresi	Kullanılan Etiket
Alkol, Aseton	Orjinal kabında son kullanma tarihine kadar, başka kaba aktarıldığında 1 hafta süresince kullanılır.	SOLÜSYON (TEHLİKELİ MADDE) ETİKETİ
Betadin, Biokadin ve Povidon Iyot	Orjinal kabında son kullanma tarihine kadar, başka kaba aktarıldığında 1 hafta süresince kullanılır.	
Formol, Formaldehit	Son kullanma tarihine kadar kullanılır.	
Dezenfektanlar	Orjinal kabında son kullanma tarihine kadar, başka kaba aktarıldığında 1 hafta süresince kullanılır.	
Temizlik Kimyasalları	Kullanım kılavuzundaki süreler geçerlidir.	
Sıvı Sabunlar	7 gün	
Distile su	Açıldıktan sonra 24 saat süresince kullanılır	Açılan İlaç Etiketi
Flakonlar	Stabil kalıyorsa açıldıktan sonra en fazla 24 saat uygun sıcaklıkta aseptik şartlarda saklanmışsa kullanılır.	
Göz ve Kulak Damlaları	Prospektüs bilgisi dahilinde kullanılır.	
İnsülin	Açıldıktan sonra 21 gün uygun sıcaklıkta aseptik şartlarda saklanmışsa kullanılır.	
Pomadlar	Prospektüs bilgisi dahilinde kullanılır.	
Şuruplar	Prospektüs bilgisi dahilinde kullanılır.	
Vazelin	Orjinal kabında son kullanma tarihine kadar	İlaç /İnfüzyon Doz Etiketi
Enjektöre çekilmiş ilaçlar ve serumlar	Prospektüs bilgisi dahilinde kullanılır.	



## ETİKETLEME TALİMATI

Döküman No	STK.TL.01
Yayın Tarihi	01.12.2009
Rev. No	01
Rev. Tarihi	04.06.2014
Sayfa No	2/2

### AÇILAN İLAÇ ETİKETİ

Hastanın Adı Soyadı : .....

Açılan İlacın Adı : .....

Açılma tarihi/SAAT : .....

Açıldıktan sonra..... saat/gün içinde tüketilmelidir.

**KULLANIMI ÖNCELİKLİ  
İLAÇ/SARF MALZEME**

### SOLÜSYON( TEHLİKELİ MADDE) ETİKETİ

Solüsyon adı : .....

Açılış tarih/ saat:.....

Son kullanma tarihi:.....

Hazırlayan : .....

### İlaç/İnfizyon Etiketi

Hasta Adı  
Soyadı : .....

Oda No: .....

İlacın Adı/Dozu: .....

.....

.....

.....

Tarih: ...../...../.....

Saat: :

Hazırlayan:

### TİBBİ ATIK ETİKETİ



Servis : .....

Tarih : .....

Saat : .....

Hazırlayan : .....

YÜKSEK RİSKLİ