

استمارة الموافقة على عملية شد الصدر

التاريخ.../../:

السيدة المريضة ، الولي/ة:

لقد تم تحضير هذه الاستمارة لتعطيك المعلومات الكافية عن هذه العملية ، التوقيع عليها بعد قرائتها شرط قانوني .
تستخدم هذه الاستمارة لتعطيك المعلومات الأولية عن العلاج الجراحي و مخاطرها و الأوضاع غير المتوقعة ، و لتعطيك
معلومات عن الطرق الغلاجية الأخرى ، المخاطر الموضحة تشمل ظروف أغلبية المرضى و المشاكل التي تواجههم.

و يجب عدم النظر إلى هذه الاستمارة على أنها تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهك . و استنادا إلى وضعك
الصحي الخاص ، وإلى المعلومات الطبية التي نملكها ، فإن طبيبك الجراحي يمكنه إعطائك معلومات إضافية بشأن هذا
الموضوع.

يرجى قراءة المعلومات المدونة في الأسفل بدقة ، و عدم الموافقة و التوقيع على هذه الإستمارة دون الحصول على اجابات
للأسئلة التي تدور في ذهنك.
معلومات عامة :

تجرى عملية رفع الثدي أو التي تعرف بشد الثدي في الحالات التالية :

فقدان الحجم وكبر الثديين بسبب تأثير الجاذبية وفقدان الوزن في مرحلة الحمل والرضاعة وتراخي الجلد وتمدده وتجرى
هذه العملية لتصحيح الصورة الجمالية.

يتم تقييم إطراق الثدي في 3 مراحل: إطراق درجة أولى: حلمة الثدي توجد على مستوى خط أسفل الثدي أو أسفلها ب 1 سم
إطراق درجة ثانية: حلمة الثدي تحت خط أسفل الثدي ب 3-1 سم وتوجه نحو المقابل. إطراق درجة ثالثة: حلمة الثدي
تحت خط أسفل الثدي بأكثر من 3 سم وتوجه نحو الأسفل. وهناك حالة تسمى إطراق زائفة، في هذه الحالة تكون الثديين
بحالة فضاضة ومتدللة على الرغم من أن حلمة الثدي تكون على مستوى الخط تحت الثدي. تستخدم جراحة شد الصدر
خلال تقنيات مختلفة. وتتم تنفيذ العمليات الجراحية بشق حول حلمة الثدي أو مع خط مستقيم تحت الثدي أو بخط تسمى عكس
حرف ت بالإنكليزي. وطبيعة مرونة الجلد تلعب دورا مهما في تحديد النتائج المرجوة وفي تحديد هيكل الثدي. واعتمادا على
التقنية المستخدمة في شد الثدي فإحتمال بقاء آثار ندبات أمر طبيعي ومحتمل الطريقة الجراحية:

تتعلق جراحة تصغير الثدي بتخفيض واضح في كمية الدهون وعضو الثدي مع وضع تثبيت الثدي باتجاه الأعلى على عكس
جراحة الشد فإنها لا تتعلق بإزالة العضو وإنما بإزالة الجلد الزائد. التصاميم المستخدمة قبل إجراء عملية تصغير الثدي هي
نفسها المستخدمة في عملية الشد. وإجراء عملية شد الثدي لا تكون كافية أحيانا للوصول إلى الحجم العادي للثدي، إذا كان
نسيج الثدي غير كافي أثناء الجراحة فإنه بالإمكان الوصول إلى النتائج المرجوة من خلال إضافة الثدي الإصطناعي. على
سبيل المثال وجود الثدي الكبير والألم يمكن ان يصعب من الحصول على النتائج المرجوة. لذلك يجب مناقشة النتائج
المتوقعة وتفصيلها قبل العملية.

علاقة جراحة شد الصدر مع سرطان الثدي والرضاعة :

جراحة شد الثدي لا تؤثر على الغدد الثديية وعلى العلاقة بين الحلمة وقنوات الحليب، لذلك لا يتوقع أوضاع سلبية أو
انخفاض مستوى الرضاعة الطبيعية لدى النساء اللواتي أجرين العملية. بالإضافة إلى ذلك لا تعتبر جراحة شد الثدي مختلفة
عن جراحة تكبير أو تصغير الثدي ولا توجد لها علاقة مع سرطان الثدي أو مع مخاطرها. تجرى جراحة شد الثدي لإعادة
إعطاء شكل للثدي ولتصغير قطر الهالة إذا تعرضت الثدي لفقدان الحجم بعد الحمل أو أنها كانت صغيرة فإنه يتم وضع ثدي

**MEME DİKLEŞTİRME
(MASTOPEKSİ) AMELİYATI
ARAPÇA
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU**

| | |
|---------------|---------------|
| Dokuman No: | YÖN.RB.130-02 |
| Yayın Tarihi: | 23.07.2014 |
| Rev.No: | 00 |
| Rev.Tarihi: | |
| Sayfa No: | 3/2 |

اصطناعي لزيادة صلابة الثدي والحصول على الحجم المطلوب. والأشخاص المناسبين لجراحة شد الثدي من هم في حالة صحية وعاطفية جيدة والمنتظرين نتائج واقعية. تترك الجراحة ندبات دائمة يمكن ملاحظتها، ولإعادة شكل الثدي للإناث هناك طرق وأساليب عدة. لو هناك حاجة إلى إجراء عملية ثدي اصطناعي مع جراحة شد الصدر فهذا يتطلب استشارة ثانية .

العلاجات البديلة : جراحة شد الصدر جراحة اختيارية والعلاج البديل هو عدم إجراء العملية واستخدام الألبسة الداخلية الداعمة، وفي حال وجود ثدي كبير فيجب إجراء عملية تصغير الثدي. وتوجد في العلاجات البديلة المخاطر والمضاعفات نفسها الموجودة في الجراحة العادية.

مخاطر جراحة شد الثدي: كل عملية جراحية لها مقدار معين من المخاطر والشيء الأهم أن تفهم ماذا سيحدث أثناء وبعد العملية. وتستند موافقة المريض على العملية من خلال المقارنة بين فوائد ومخاطر العملية. ومع احتمالية عدم مشاهدة المضاعفات فعلى المريضة أن تطلب من الطبيب سرد جميع المضاعفات المتوقعة حدوثها والتأكد منها.

النزيف : احتمال حدوثه ضئيل جدا ولكن رؤيته أمر طبيعي، وفي حال حدوثه يطلب نقل دم بشكل سريع إلى المريض. يمنع استخدام الإسبرين أو العقاقير المضادة للالتهابات قبل عشرة من العملية لأنها تزيد من احتمال حدوث النزيف.

العدوى: رؤيتها نادرة جدا وفي حال حدوثها يتم العلاج عن طريق إعطاء مضادات حيوية أو عن طريق التدخل الجراحي الإضافي .

تغيرات في حلمة وإحساس الثدي: حدوثه أمر طبيعي ولكنه مع مرور الزمن يعود الإحساس مثلما كان، وفقدان جزئي أو دائم في إحساس الجلد أمر نادر .

الأثار المتبقية في الجلد: تبقى آثار قليلة أو كثيرة حسب العمليات الجراحية. يؤثر التئام الجروح بشكل جيد والإقلال من التوتر بنتائج إيجابية على مسار العملية. الخياطة المتوترة وعرضة الشخص للإصابة بندبات سيئة يمكن أن تسبب ببقاء ندبات واضحة. ولتصحيح هذه الندبات والآثار يتطلب إجراء جراحات أخرى بعد أكثر من مرور عام على العملية الجراحية .

زرع الثدي : والمخاطر الموجودة هنا قد تم شرحها في استشارة أخرى .

الصلابة : نتيجة لتشكّل الندبة فإن هذا يزيد من احتمال حدوث صلابة في الثدي وهذه الحالة لا يمكن التنبؤ بها من قبل وقد تتطلب الحالة إجراء عمليات إضافية ضرورية.

نتائج غير متوقعة أو مقنعة: هناك امكانية الحصول على نتائج غير مقنعة بعد إجراء العملية. وتقيم مخاطر مستحضرات التجميل ونشوهات ظاهرة غير مقبولة وقد تكونين غير مقنعة بشكل وحجم الصدر.

تأخر الشفاء: يمكن حدوث تأخر الشفاء أو حدوث انتفاخ في الجرح، وقد يتطور نخر في الجلد أو في حلمة الثدي. في هذه الحالة يمكن تطبيق ضمادات لفترات طويلة أو بإجراء تدخل جراحي إضافي والمدخنون هم أكثر عرضة لحدوث مشاكل تأخر الشفاء أو فقدان جزء من الجلد.

عدم التماثل: معظم النساء يعانين من مشكلة عدم التماثل في الحالة العادية. ويمكن أن تحدث هذه الحالة بعد إجراء العملية وفي حال تطور عدم التناسق في الثدي أو حلمة الثدي فإن هذا يتطلب إجراء جراحي ثاني .

ردود الفعل التحسسي: نادرا ما تظهر ولكنها تتطور في حالات استخدام شرائط ومواد خياطة الجروح واستخدام كريمات مرطبة. ونادرا ما تحصل ردود فعل نظامية وهي الأخطر وذلك أثناء استخدام أدوية أثناء الجراحة. ويتطلب المزيد من المعالجة في هذه الحالات.

**MEME DİKLEŞTİRME
(MASTOPEKSI) AMELİYATI
ARAPÇA
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU**

| | |
|---------------|---------------|
| Dokuman No: | YÖN.RB.130-02 |
| Yayın Tarihi: | 23.07.2014 |
| Rev.No: | 00 |
| Rev.Tarihi: | |
| Sayfa No: | 3/3 |

التخدير الجراحي : يوجد مخاطر للتخدير سواء كانت موضعية أو عامة. مخاطر المضاعفات والجروح والموت توجد في جميع استمارة التخدير الجراحي.

متطلبات جراحية إضافية: يتطلب علاج المضاعفات جراحات إضافية أو معالجات طبية. وعلى الرغم من أن المضاعفات والمخاطر تحدث قليلا ولكن علينا أن نتوقع حدوثها مع أي مريض و لا يمكن إعطاء ضمان بشأن النتائج مهما كانت النتائج المنتظرة جيدة.

أعبر عن رضائي و إطمئناني من خلال التوضيحات الشفوية و الكتابية التي قدمت لي بصفتي الشخصية وبكامل إرادتي ، و من خلال التوضيحات الخطية الموضحة لي ، أوافق على العلاج و العملية التي ستطبق لي و على طرق العلاج الأخرى التي ستطبق لي لاحقا.

| | |
|---|---------------------------------|
| إذا كانت المريضة بدون وعي و يوجد بجانبها ممثل قانوني: | إذا كانت المريضة في حالة وعي: |
| الممثل القانوني (الوصي) أو الولي | المريضة |
| اسم المريضة واسم العائلة.....: | اسم المريضة واسم العائلة.....: |
| اسم المريضة واسم العائلة.....: | العنوان.....: |
| العنوان.....: | رقم الهاتف.....: |
| رقم الهاتف.....: | التوقيع.....: |
| التوقيع.....: | |
| الدكتور | الدكتور |
| اسم الدكتور و اسم العائلة.....: | اسم الدكتور و اسم العائلة.....: |
| التوقيع.....: | التوقيع.....: |
| الشاهد | الشاهد |
| اسم الشاهد واسم العائلة.....: | اسم الشاهد واسم العائلة.....: |
| التوقيع.....: | التوقيع.....: |

السيد عصام عجوز : مدير العلاقات بمستشفى تشفيرى التركي)